

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL: 110f

REGISSEUR RECETTES D.D.A.F.



RÉGION RHÔNE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03

15 mai 1986

N° de série continue 121

Bulletin n° 11

PECHER : SIGNALEZ-NOUS TOUT DEPERISSEMENT BRUTAL ou INEXPLIQUE

POMMIER : EN MAI-JUIN ATTENTION AUX RISQUES DE RUGOSITE

P1 ARBRES FRUITIERS ET VIGNE : **Grêle** : que faire après ?

PECHER : **Oïdium, tavelure** : soignez la protection des vergers sensibles

Dépérissements : en cas de doute tél : 75.42.77.68 (PV Valence) ou 75.93.56.86 (PV AUBENAS)

Tordeuse Orientale : début de protection des pépinières et jeunes vergers

Myzus : surveillez le développement des colonies

P2 PRUNIER : **Carpocapse des prunes**)

POIRIER : **Psylle**)

il est encore trop tôt pour intervenir

POIRIER-POMMIER : **Tavelures** : des risques encore importants, mais prudence dans l'usage des produits curatifs

POMMIER : **Oïdium** : maintenez la protection

Mineuse cerclée : le 1er vol a débuté

VIGNE : **Mildiou** : des précautions importantes pour diminuer les risques

P3 VIGNE : **La lutte chimique contre le mildiou de la vigne en 1986**

Des recommandations pour éviter le développement des souches résistantes aux anilides

P4 FRAMBOISIER : **Canevas de protection** en Bas-Vivaraïs

CASSIS : **Oïdium, anthracnose, pucerons et acariens** : à surveiller

ARBRES FRUITIERS ET VIGNE

APRES UNE GRELE : Intervenez le plus tôt possible

Plus le traitement est tardif, plus il perd de son efficacité.

Au-delà de 24 à 36 heures après, toute protection devient aléatoire. Intervenez impérativement dans les 24 heures si vous utilisez un produit de contact.

Produits utilisables :

- Sur arbres fruitiers : captane (nb. spéc.), bénomyl, carbendazyme (nb. spéc.), thiophanate méthyl (PELT 44, PELTIS 40), iprodione (ROVRAL), vinchlozoline (RONILAN), triforine (SAPROL).
- Sur vigne : folpel 300 g ma/hl (nb. spéc.), captane 500 g ma/hl (nb. spéc.), dichlofluanide 200 g ma/hl (EUPARENE).

ARBRES FRUITIERS

PECHER

OIDIUM : Période critique jusqu'au durcissement du noyau

En verger sensible : Intervenez tous les 17 jours

En verger peu sensible : Débutez la protection dès l'apparition des **lèrs symptômes** sur fruit

TAVELURE : Maintenez la protection en verger habituellement atteint

DEPERISSEMENTS : Surveillez vos vergers et particulièrement les jeunes

Actuellement apparaissent des dégâts d'asphyxie suite à l'humidité excessive due aux pluies d'avril (collet et/ou racines nécrosés).

Veillez à ce que le point de greffe soit au-dessus du niveau du sol.